



# Suivi de l'enfant de 10 à 14 jours (suite)

## Examen physique (âge corrigé sur courbes de croissance si prématuré)

Poids\*: \_\_\_\_\_ Perc: \_\_\_\_\_ Taille: \_\_\_\_\_ Perc: \_\_\_\_\_ PC: \_\_\_\_\_ Perc: \_\_\_\_\_ P/T: \_\_\_\_\_

\* minimum 20-30 g/j

Apparence générale: \_\_\_\_\_

- Fontanelle, sutures
- Forme de la tête
- Reflet rétinien
- ORL
- Cou (torticolis?)
- Clavicules
- Cœur
- Poumons

- Abdomen, ombilic
- Membres
- Hanches (Ortolani Barlow)
- Pouls fémoraux
- OGE (testicules ♂)
- Région sacrée (sinus)
- Anus
- Téguments (jaunisse): \_\_\_\_\_
- Blessures?(ecchymoses, lésions intra-orales, hémorragie...): \_\_\_\_\_

### POSITION DORSALE

- Flexion 4 membres
- Mouvements fluides et symétriques des membres

### TIRÉ ASSIS

- Flexion de la tête en fin de course (head lag)

## Observations spontanées

---

---

## Promotion des saines habitudes de vie et conseils préventifs

- Soutien à l'allaitement**
- Sécurité (détecteur de fumée, **protection solaire**, *remisage des armes à feu*)
- Conseils pour la prévention du SMSN:
  - Sommeil sur le dos uniquement
  - Même chambre ad 6 mois, mais lit seul
  - Temp. ambiante environ 20°C
  - Éviter tabagisme passif
  - Vaccination à jour de l'enfant et de la famille
  - L'allaitement a un effet protecteur
- Pas de biberon au lit
- Prévention plagiocéphalie**
  - Consultation précoce si fièvre ( $\geq 38^\circ\text{C}$  rectal)
  - Prévention du TC-ME (trauma crânien causé par la maltraitance des enfants)
- Discussion vaccination**
  - Soins du prépuce ♂
  - Munitions sans plomb

## Impressions et conduites

### Impressions

- Santé physique :  
\_\_\_\_\_
- Croissance :  
\_\_\_\_\_
- Développement :  
\_\_\_\_\_
- Autre(s) impression(s) :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Conduites

---

---

---

---

---

---

---

---

### Conduite générale

- Vaccin anti-hépatite B: vérifier HBIg et 1<sup>er</sup> vaccin donnés en période néonatale si bébé de mère porteuse HBsAG(\*)**
- Nirsévimab (1 dose par saison virale, vérifier éligibilité)
- BCG: si résultat DICS reçu est négatif (voir formulaire de vaccination pour le BCG)
- Dépistage visuel et auditif\*
- Référence aux programmes spécifiques (SIPPE)
- Supplément de fer si prématuré ou petit poids à la naissance (< 2500 g):
  - Voir Guide d'accompagnement pour dosages recommandés
- Remettre trousse de vaccination

Signature : \_\_\_\_\_ Prochain RDV : \_\_\_\_\_

(\*) Si l'enfant est à risque: voir Recommandations: <https://enseignement.chusj.org/fr/Formation-continue/ABCdaire/recommandations>

Recommandations: **gras = A, italique = B**, caractère ordinaire = C ou I, **souligné** = bonnes pratiques en prévention clinique du MSSSQ.

Par Gilles Brunet, MD, Gilles Cossette, IPSPL, Dominique Cousineau, MD, FRCPC, Julie Desjardins, MD, Danièle Lemieux, MD., Lise Bélanger, MD, FRCPC, Alena Valderrama, MD, FRCPC, © 2019 CHU Sainte-Justine