



## Suivi de l'enfant de moins d'une semaine

♂  ♀  Date de la visite: \_\_\_\_\_ Âge chrono: \_\_\_\_\_ Âge corr.: \_\_\_\_\_ Accompagné de: \_\_\_\_\_

### Préoccupations parentales

---



---

### Contexte de vie

- « Blues » du postpartum vs dépression périnatale ? : \_\_\_\_\_  Adaptation de la famille au nouveau-né ? : \_\_\_\_\_  
 Soutien social ? : \_\_\_\_\_  Insécurité alimentaire ? : \_\_\_\_\_  
 Facteurs de stress (séparation, maladie, décès, abus de substances, etc.) ? : \_\_\_\_\_  
 Autre : \_\_\_\_\_

### Suivi de la santé et évolution récente

- Jet urinaire ♂ : \_\_\_\_\_  Voyage récent ou prévu (2) ? \_\_\_\_\_  
 Histoire de blessure ou « lésion sentinelle » ? \_\_\_\_\_

### Habitudes de vie actuelles

#### Nutrition

- Allaitement exclusif ?**  Allaitement mixte ?  
 Nbre de boires/j: \_\_\_\_\_  Eau non nécessaire si allaitement exclusif  
 Vitamine D 400 U.I.: bébé allaité ou prématuré (200 U.I./kg/j)  Autres suppléments/produits naturels ? \_\_\_\_\_  
 Préparation commerciale pour nourrisson avec fer (6-20 oz ou 180-600 ml/j)  Mictions (normal ≥ 6/j): \_\_\_\_\_  
 Qté : \_\_\_\_\_ Type: \_\_\_\_\_  Selles (normal ≥ 2/j): \_\_\_\_\_  
 Dillution adéquate ? : \_\_\_\_\_  Régurgitations ? \_\_\_\_\_  
 Autre: \_\_\_\_\_  Étouffement lors des boires ? \_\_\_\_\_

Sommeil ? : \_\_\_\_\_ Position ventrale en période d'éveil ? : \_\_\_\_\_

### Surveillance du développement (âge corrigé pour prématurés)

- A une bonne succion  Dépistage auditif fait ?  Pleure de façon excessive ? (> 3h/jour)

---



---

# Suivi de l'enfant de moins d'une semaine (suite)

## Examen physique (âge corrigé sur courbes de croissance si prématuré)

Poids\*: \_\_\_\_\_ Perc: \_\_\_\_\_ Taille: \_\_\_\_\_ Perc: \_\_\_\_\_ PC: \_\_\_\_\_ Perc: \_\_\_\_\_ P/T: \_\_\_\_\_

Apparence générale: \_\_\_\_\_

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fontanelle, sutures | <input type="checkbox"/> Abdomen, ombilic            | <input type="checkbox"/> Moro symétrique                                |
| <input type="checkbox"/> Forme de la tête    | <input type="checkbox"/> Membres                     | <b>POSITION DORSALE</b>   |
| <input type="checkbox"/> Reflet rétinien     | <input type="checkbox"/> Hanches (Ortolani Barlow)   | <input type="checkbox"/> Flexion 4 membres                              |
| <input type="checkbox"/> ORL                 | <input type="checkbox"/> Pouls fémoraux              | <input type="checkbox"/> Mouvements fluides et symétriques des membres  |
| <input type="checkbox"/> Cou (torticolis?)   | <input type="checkbox"/> OGE (testicules ♂)          | <b>TIRÉ ASSIS</b>   |
| <input type="checkbox"/> Clavicules          | <input type="checkbox"/> Région sacrée (sinus)       | <input type="checkbox"/> Flexion de la tête en fin de course (head lag) |
| <input type="checkbox"/> Cœur                | <input type="checkbox"/> Anus                        |   |
| <input type="checkbox"/> Poumons             | <input type="checkbox"/> Téguments (jaunisse): _____ |   |
|  | <input type="checkbox"/> Blessure?: _____            |   |
|  | (Ecchymose, lésion intra-orale ou autre)             |   |

### Observations spontanées

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Promotion des saines habitudes de vie et conseils préventifs

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Soutien à l'allaitement</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Sommeil sur le dos uniquement</b>         | <input type="checkbox"/> Emmaillotage? (prudence: hanches et SMSN)                                  |
| <input type="checkbox"/> Sécurité (siège d'auto, T° chauffe-eau 60°C + un dispositif anti-brûlures, détecteur de fumée, espacement des barreaux du lit < 6cm, animaux, partage du lit, <b>protection solaire</b> ) | <input type="checkbox"/> T° ambiante: environ 20° C                   | <input type="checkbox"/> Consultation précoce si fièvre (≥ 38°C rectal)                             |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Tabagisme passif</b>                      | <input type="checkbox"/> Prévention du TC-ME (trauma crânien causé par la maltraitance des enfants) |
|  | <input type="checkbox"/> Sommeil même chambre ad 6 mois, lits séparés | <input type="checkbox"/> <b>Discuter vaccination</b>  |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Prévention plagiocéphalie</b>             | <input type="checkbox"/> Stimulation du développement (document pour les parents)                   |
|  |   | <input type="checkbox"/> Soins du prépuce ♂   |

## Impressions et conduites

### Impressions

- Santé physique : \_\_\_\_\_
- Croissance : \_\_\_\_\_
- Développement : \_\_\_\_\_
- Autre(s) impression(s) : \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### Conduites

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Conduite générale

- Dépistage néonatal sanguin et urinaire**
- Oui  Refus
- Vaccin anti-hépatite B: vérifier HBIG et 1<sup>er</sup> vaccin donnés en période néonatale si bébé de mère porteuse HBsAG(\*)**
- Palivizumab (Synagis®) si éligible**
- Dépistage visuel (\*)
- Dépistage auditif si non fait pour tous
- Programme SIPPE si parent sous seuil de faible revenu ET au moins 1 facteur de risque: sous-scolarisation et/ou isolement social (\*)**
- Outils ou ressources pour les parents: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Prochain RDV : \_\_\_\_\_

(\*) Si l'enfant est à risque, cf guide.

Recommandations: **gras = A, italique = B**, caractère ordinaire = C ou I, **souligné** = bonnes pratiques en prévention clinique du MSSSQ.

Par Gilles Brunet, MD, Gilles Cossette, IPSPL, Dominique Cousineau, MD, FRCPC, et Danièle Lemieux, MD, Lise Bélanger, MD, FRCPC, Alena Valderrama, MD, FRCPC, Julie Poirier, IPSPL © 2019 CHU Sainte-Justine