

Suivi de l'enfant de 2 mois (suite)

Examen physique (âge corrigé sur courbes de croissance si prématuré)

Poids: _____ Perc: _____ Taille: _____ Perc: _____ PC: _____ Perc: _____ P/T: _____

Apparence générale: _____

- Fontanelles, sutures
- Forme de la tête
- Reflet rétinien
- Reflet cornéen
- Poursuite oculaire
- ORL
- Cou (torticolis ?)

- Cœur
- Poumons
- Abdomen
- Membres
- Hanches (Ortolani Barlow)
- OGE (testicules)
- Téguments : _____
- Blessures (ecchymose...)
Référer au médecin si enfant très hypotonique ou si ne réagit pas aux stimuli

POSITION DORSALE

- Tourne la tête des deux côtés
- Mouvements fluides et symétriques des membres

POSITION VENTRALE

- Lève la tête à 45° avec appui sur avant-bras

TIRÉ ASSIS

- Meilleur contrôle de tête

Observations spontanées

Promotion des saines habitudes de vie et conseils préventifs

- Soutien à l'allaitement**
- Position ventrale 30 min/jour en période d'éveil**
- Aucun solide précoce dans le biberon
- Sécurité (*chutes, étouffement, pyjama ininflammable, protection solaire*)
- Sommeil sur le dos uniquement
- Tabagisme passif
- Pas de biberon au lit
- Prévention trauma crânien causé par la maltraitance des enfants
- Prévention plagiocéphalie
- Hygiène nasale
- Conduite en cas de fièvre
- Éviter ROH grossesse future

Impressions et conduites

Impressions

- Santé physique :

- Croissance :

- Développement :

- Autre(s) impression(s) :

Conduites

Référer au programme Agir Tôt si difficultés ou retard de développement détectés.
Référer en physio si plagiocéphalie.
Référer au SIPPE si non suivi et si disponible dans sa communauté.

Conduite générale

Immunisation :

- Refusée Reportée
- DCaT-HB-Polio-Hib**
 - Vaccin anti-rotavirus**
 - Vaccin antipneumocoque conjugué**
 - Nirsévimab (1 dose par saison virale, vérifier éligibilité)**
 - Vaccin antiméningocoque A, C, Y, W₁₃₅ (*)*
 - Vaccin antiméningocoque B (*)*
 - BCG reçu ?
 - FSC, ferritine si prématuré ou poids de naissance < 2500g (*)*
 - Dépistage auditif si non fait et disponible
 - Dépistage syphilis à faire chez la mère 6 à 8 semaines post-partum

Signature : _____ Prochain RDV : _____